

Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA

Popis

Je hydroaktívne krytie na rany, s extra absorpčnou schopnosťou.

Vlastnosti

Je tvorené dvojvrstvovo, vnútorná vrstva pozostáva z gélotvorných extra absorbujúcich polymérov, ktoré viažu a uchovávajú veľké množstvo exudátu a škodlivých látok, baktérií. Krytie je možné používať aj pod tlakom. Vonkajšia vrstva je vyrobená z ultrazvukovo utesneného polypropylénového vlákna. Výrobok neobsahuje žiadne liečivé látky. Neobsahuje žiadne senzibilizujúce zložky, ani lepidlá. Znižuje bakteriálnu záťaž na lôžko rany absorpciou a viazaním prítomných baktérií (napr. MRSA), v dôsledku zníženia bakteriálnej záťaže je zápach rany eliminovaný. Vlhkosť rany je zachovaná, čím je podporené prirodzené hojenie rán.

Oblasť použitia, indikácie

Liečba rán s vysokou sekréciou, ako sú dekubity, diabetická noha, mokvajúci ulcus cruris, u sekundárne liečených mokvajúcich rán po laparotómii, na popálené oblasti so sekréciou, pri hnisavých fistulách kože, pri fistule žľáz, pankreasu, hrubého čreva, pri karcinóme čelusti, pri exulcerovaných karcinómoch a pri podobných ranách s produkciou sekrétu.

Pokyny na použitie

1. Pred použitím výrobku overte, či rana produkuje dostatočné množstvo tekutiny.
2. Vyčistite ranu bežným postupom. V prípade kombinácie s inými prípravkami s obsahom olejov majte na pamäti, že môžu znížiť absorpčnú schopnosť výrobku Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA. Suché oblasti rany môžete prikryť kontaktnou vrstvou ako napr. výrobok Sorbion Plus.
3. Zvoľte výrobok takého tvaru a rozmerov, ktorý presahuje rany. Polypropylénový obal neotvárajte a obklad neorezavajte na inú veľkosť! Zvrásnenie výrobku môže ovplyvniť jeho maximálnu pohlcovaciu schopnosť.
4. V závislosti na povahe povrchu rany priložte Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA priamo ako primárny obklad na ranu.
5. Podľa požadovaného spôsobu ošetrovania, stavu okolia rany a pokožky zvoľte a použite vhodnú fixáciu. Ako fixácia môžu slúžiť filmy, náplaste alebo iné vhodné upevnenie obvazom. Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA sa osvedčil ako mimoriadne efektívny v rámci kompresnej terapie, napríklad u bercového vredu (Ilcus cruris venosus).
6. Obzvlášť na začiatku ošetrovania by mal byť obvaz pravidelne kontrolovaný. Vzhľadom k vysokej savosti a z toho vyplývajúcej hmotnosti by nemal byť výrobok úplne nasýtený. Obvaz vymeňte skôr než tekutina presiakne, najneskôr však po 4 dňoch. Maximálne trvanie pobytu závisí od pacienta a od stavu zranenia.

Kombinácia s inými produktmi pri ošetrovaní rán

Výrobci nie sú známe v kombinácií s inými výrobkami na ošetrovanie rán žiadne nezlučiteľné kombinácie. Napriek tomu by ste sa mali vyhnúť kombinácií Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA s výrobkami, ktoré obsahujú silno oxidujúce látky (ako peroxid vodíka alebo manganistan draselný), silno alkalické látky alebo silno kyslé zložky. V prípade kombinácie s nanosenou vrstvou masti alebo krému na ranu je potrebné zvážiť, že masť sa dostane do pórov Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA a tým sa môže znížiť jeho účinok.

Vedľajšie účinky

Pretože výrobok je optimalizovaný pre rýchlu absorpciu tekutín, môže u suchých rán dôjsť k zlepeniu s tkanivom rany a k iným nežiadúcim efektom. Preto by u takých rán mal byť výrobok kombinovaný s výrobkami na gélovej báze, alebo s výrobkami obsahujúcimi kontaktnú vrstvu, ako je výrobok Sorbion Plus.

Jeden plátok Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA môže podľa veľkosti absorbovať i niekoľko sto gramov tekutiny. Toto môže v závislosti od hmotnosti viesť k zhoršeniu stavu rany, čo by mohlo mať za následok zhoršenie perfúzie i u zdravého tkaniva. Napríklad presýtený obklad Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA môže v závislosti od absorbovanej tekutiny vážiť až 400g. Preto pravidelne vymieňajte obklad na rany. Prechodné a zdanlivé zväčšenie rany, napr. pri preležaninách, môže obmedzovať hojenie a je prípadným nežiaducim efektom začínajúceho procesu hojenia.

Kontraindikácie

Kontraindikácie nie sú doposiaľ známe. Aj napriek tomu zabráňte prístupu do nasledujúcich oblastí, kvôli nebezpečenstvu vysušenia a zlepenia. Ide o oblasť očí, suché oblasti rany (obzvlášť v prípade súčasne konanej kompresnej terapie, napr. u suchého Ulcus cruris), vysychajúce oblasti rán, iné oblasti alebo oblasti s nízkou tvorbou sekrétu.

Dátum revízie textu:
Júl 2015

Výrobca: BSN medical GmbH
Quickbornstraße 24, POB: 22771,
20253 Hamburg, Nemecko

Distribútor pre SR:
Ortopine, s.r.o.
Komárnická 16955/11
821 03 Bratislava
mail: ortospine@ortospine.sk



0124

